

## 成美醫院一級藥物交互作用表

藥品 1	藥品 2	交互作用
Aminfec Gentamycin	Atracurium	肌肉鬆弛劑作用會加強。
Aminfec Gentamycin	Lasix	Lasix 會提高胺糖類抗生素的耳毒性、腎毒性。
Aspegic Bokey	Apano Heparin	提高出血的危險性。
Aspegic Bokey	Ibuprofen Naprosin Ponstan Voren	提高胃的刺激性。 降低 Aspirin 的 Cardioprotective 作用。
Aspegic Bokey	Ketorolac	提高 Ketorolac 的副作用。
Bosmin	Inderal	產生過度心跳徐慢，並有可能伴隨心臟阻斷 須小心監視。
Decan Prednisolone Rinderon	Vagostin	降低 Vagostin 作用。
Dropel	Amiodarone	增加發生 QT 間隔延長心律不整之風險。
Ergometrine	Apano Diflucan Ilosone Paxlovid	引起急性麥角鹼中毒。
Ergometrine	Ephedrine Methylephedrine Norepinephrine Pseudoephedrine	Ergometrine 增加麻黃素類藥物之藥理作用及 有害反應。
Fentanyl	Diflucan	提高鴉片類鎮痛藥之藥理作用及有害反應。
Ilosone	Diflucan	增加發生 QT 間隔延長心律不整之風險。
Rocephin	Calcium gluconate Lactated Ringer	Rocephin 與含鈣溶液併用，容易沈澱在肺臟及 腎臟引起嚴重不良反應。
Vibramycin	Amoxicillin Ampicillin Ziefmycin (Diclocil)	Tetracyclines 會抑制蛋白質合成，會干擾 Penicillin 抑制細胞壁合成的作用，降低其 殺菌作用。

說明：上表所列同一色塊之藥品 1(任一種藥品)+藥品 2(任一種藥品)併用，  
會產生右欄所述之藥品交互作用。